

OSK-1 小鼠诱导型多能干细胞(iPS 细胞)

本产品仅供科研实验使用

基本信息:

Catalogue No : C915

Product Format : a T25 flask

Culture Properties: 贴壁

Complete Growth Medium : 89%H-DMEM+10%FBS+1%双抗

Atmosphere : air, 95%; carbon dioxide (CO₂), 5%

Application : Cells and cancer research

NOTE : FOR RESEARCH USE ONLY

产品组成:

Item	Specifications
a T25 flask	2X10 ⁶
Manual	1 copy

细胞培养操作步骤:

- 1.吸走用于培养基, 加入 3-5mL PBS 后轻轻晃动培养瓶润洗细胞。
- 2.吸干净 PBS 后加入 1mL 0.25%胰酶-0.53mM EDTA, 轻轻摇晃培养皿使胰酶浸没细胞表面, 培养瓶放 37 度培养箱消化; (细胞对于消化比较敏感, 消化过度会严重影响细胞状态, 导致细胞传代死亡漂浮或者传代后不长。细胞消化到细胞间隙变大但未脱落, 可以轻轻吹下时即可终止, 禁止消化到细胞完全漂浮。混匀细胞时尽量轻柔, 不要吹出大量气泡。)
- 3.加入 6-8ml 完全培养基终止消化, 轻轻吹下细胞混匀。

4.将混匀的细胞 1000rpm (约 150g) 离心 3min, 弃上清, 再用新鲜培养基重悬 37 度培养箱继续培养。

传代比例：不同细胞生长速度不一, 具体传代比例视细胞生长速度而定, 大部分细胞适用 1:3-1:4 传代, 生长较慢的细胞可以 1:2 传代。

细胞保存:

1.冻存液: 92%完全培养基+8%DMSO (可以根据实验室条件自行选择)

2.降温步骤: 4 度 10min, -20 度 2h, -80 过夜后液氮保存。

小提示:

1.细胞经过运输后, 部分细胞由于温度变化及剧烈碰撞死亡破碎形成碎片, 是正常现象。贴壁细胞可以消化, 悬浮细胞直接混匀收集细胞, 900-1000rpm(约 150g)离心 3min, 弃上清。加 5ml PBS 重悬细胞, 再 900-1000rpm(约 150g)离心 3min, 用新鲜的完全培养基重悬接种到新的培养瓶。第二次 PBS 重悬是为了去除碎片, 如果平时碎片比较少, 传代时可以省略 PBS 重悬的步骤; 如果碎片很多, 建议 PBS 多洗几次。

2.细胞生长不均时, 可以将细胞消化吹散后加入新的培养基重新接种或传代。

3.细胞生长缓慢时, 可以选择提高血清浓度培养 (最高不超过 20%), 也可以根据细胞生长状态, 选择传代细胞到新的培养瓶中继续培养。

4.不同细胞贴壁性差异比较大, 所以消化时间差别较大, 20s-10min 均有可能, 具体以细胞消化到相互分离但未脱落, 并可以轻轻吹下为准, 严禁消化到细胞完全漂浮。客户消化过度导致细胞死亡、漂浮、生长缓慢, 不提供免费售后服务。

5.干冰发货均为两支, 客户先复苏一支, 若复苏失败及时联系我方并在我方指导下复苏第二支。若客户同时复苏两支均状态不佳, 我方不提供免费售后服务。

6.细胞状态正常时, 应尽快冻存细胞保种, 冻存后应随机抽取一支检测冻存效果。我方不对

客户冻存细胞导致死亡负责，客户冻存细胞死亡不提供免费售后服务。

注意事项：

客户收到细胞有任何疑问请及时致电我们，细胞收到后 1 周内没有任何电话，或其他形式回访，默认为细胞质量没问题，之后出了任何问题不给予免费售后。细胞免费售后只提供一次，若重发后再次培养死亡不再免费补发，细胞收货时已经死亡或密度不足的除外。

订购热线： 021 - 54720761

咨询 QQ： 2881498726

咨询电话： 13166274233(微信同号)